

Carrapeta ou Marinheiro

Guarea guidonia (L) L. Sleumer

Família: Meliaceae

Classificação: espécie secundária tardia

Porte: 15 - 20 m

Zona de ocorrência natural: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins; Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe; Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso; Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo; Paraná.

Informações ecológicas: Planta perenifólia, heliófita, seletiva higrófila, característica de matas de galeria. Sua dispersão é maior em formações secundárias localizadas ao longo de rios, planícies aluviais e fundo de vales. No interior da floresta densa sua frequência é menor.

Outros usos: Construção civil ou naval, carpintaria, caixotaria. Paisagismo rural e urbano. Folhas tóxicas para o gado. Frutos muito procurados pela avifauna.

Época de floração: dezembro - março

Cor da flor: creme

Época de frutificação: novembro - dezembro

Tipo de fruto: cápsula

Tipo de dispersão: zoocórica

Polinização: melitofilia, falenofilia, psicofilia e cantarofilia.

Características da folha: folhas compostas de 30-40 cm de comprimento, com 6-10 pares de folíolos de 20-30 cm de comprimento. As folhas possuem crescimento contínuo, assemelhando-se a ramos em seu comportamento.

Filotaxia: alterna.

